

තක්කාලි වගාවේ රෝග

කායික විද්‍යාත්මක අකාමාන්‍යතා

ලක්ෂණ

පාලනය

ගෙඩිවල යට කුණු වීම



- ගෙඩියේ යට පැත්ත කුණු වී කළු පැල්ලමක් ඇති වේ.

- ක්‍රමාණුකූල ජල පාලනය
- නිර්දේශිත පොහොර භාවිතය
- පසට කැල්සියම් යෙදීම

ගෙඩි පිටිවීම



- ගෙඩි වල වලයාකාර, අරිය හා අක්‍රමවත් පිපිරීම් ඇති වේ

- ක්‍රමාණුකූල ජල පාලනය
- පසට කැල්සියම් අඩංගු පොහොර යෙදීම

යුර්ව පිළිස්සීම



- ගෙඩි වල සුදු පැහැති පැල්ලම් ඇති වේ

- ගෙඩි හිරු වලියට කෙලින්ම නිරාවරණය නොකිරීම

ගෙඩි ඇතුළත හිස්වීම



- ගෙඩි ඇතුළත නොපිරුණු ස්වභාවය

- නිර්දේශිත පොහොර භාවිතය
- හියමිත පරතරයට පැළ සිටුවීම

සැකයුම - හොට් වීර්ස් (වර්ණයන් නිලධාරීන්)
 සෘජුබිහි ඉන්ද්‍රපාන (විෂයාධිකාරී සහකාර), හෙක්ට් වික්‍රමසිංහ (කෘෂි උපදේශක)
 ඊවිඒද විශ්වවිද්‍යාල (විනාශය නිලධාරී)
 උද්‍යාන හෝග වර්ණයන් හා සංවර්ධන ආයතනය - ගාල්ලහරළුව



රෝගය

ලක්ෂණ

පාලනය

දියමලන්කෘත



- පැළ ඇද වැටී හෝ මැළ වී පසුව මැරී යාම

- තවත් පීචාණුහරනය කර බීජ දැමීම
- බීජ ප්‍රතිකාරක යෙදීම - දිලීර නාශක (හෝමායි, තිරාමී, කැප්ටාන්)

බැක්ටීරියානු හිටු වැරදීම



- පැළ මැළවීම
- කඳු කපා චතුරට දැමූ විට කිරි පාට නූල් ආකාර දැකගත හැක

- ප්‍රතිරෝධී වර්ග වගා කිරීම
- ජලය බැස්සවීම
- පසට කාබනික පොහොර යෙදීම

දිලීර වැළවීම



- ගස මැළවීම
- ගසේ පාමුල හා මුල් කුණුවීම
- සමහර විට මුල් හා පාමුල කොටසේ සුදු පාට දිලීර දැකගත හැකිවීම

- ජලය හොඳින් බැස යාම සඳහා ගැඹුරු කාණු යෙදීම
- පැළ වල මුල් හොඳින් තෙමෙන සේ දිලීර නාශක යොදන්න - දිලීර නාශක (හෝමායි, තිරාමී, ටොප්සින්)

අංගමාංගය



- කොළ හා කඳේ දුඹුරු හෝ කළු පුල්ලි (වැසි ඇති විට ඉක්මනින් පැතිර යයි)
- ගෙඩි වලට ද පැතිරී යයි

- වැසි සහිත කාලගුණයේදී රෝගය ඉක්මනින් පැතිරී යන නිසා රෝග ලක්ෂණ දැටු වහාම මෙම දිලීර නාශක යෙදිය යුතුයි. එයින් 2 ක් තෝරා මාරුවෙන් මාරුවට සති 2 ට වරක් යොදන්න. (රිඩොමිල්, ඩැකොනිල්, මැන්කොසෙබ්, මැනෙබ්)
- නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය පමණක් යෙදීම
- රෝගී ගස් හා ගෙඩි කෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කර විනාශ කිරීම

පිටිපුස් රෝගය



- සුදු පාට පිටි වැනි දිලීර කොටස් කොළවල යට පැත්තේ ඇති වීම
- කොළ කහ පාට වීම

- සල්ෆර් කුඩු යෙදීම

අඳන්තූරුකෘතෝස්



- ගෙඩි කුණු වීම
- මල් හැලී යාම
- කඳු කුණු වීම (වැසි ඇතිවිට රෝගය දරුණු වේ)

- පහත දිලීර නාශක වලින් එකක් ඉසින්න
- ඩැකොනිල්, මැන්කොසෙබ්, ටොප්සින්, මැනෙබ්, කාබෙන්ඩිසීම්