

වල් පැලෑටි පාලනය

වගාවේ මුල් සති හය තුළ දී බෝගයේ සම්පුර්ණයෙන් වල් පැලෑටි පාලනය කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න.

කෘමි පාලනය

බඩගුරුඹ පුරුක් පණුවා

විශේෂයෙන් යළි කන්නයේදී පුති, පුලි සහ අනෙක්තු මාසවල වගා කළට්ටි මෙම කෘමි හානිය දරුණු විය හැක. දළඹුවා විසින් ලපටි පැළවල අගුස්වැයට හානි කරයි. වැඩුණු ගාකවල කඳු සිදුරු කිරීම නිසා ගසෙහි ඉහළ කොටස මැරී යයි.



පාලනය

නිරෝදහීන කෘමිහානක

හානිය අධික නම් සිටුවා සති 2-3 කාලයේදී ඩයසිනෝන් 5% කැට හෙක්ටයාරයකට කි.ග්‍රෑ. 10-15 ක් පත්‍ර ගොබියට යොදන්න. ඩයසිනෝන් දියට මෙම අවස්ථාවේ ඉසීමට පුළුවන.

අස්වනු හෙලීම

කරල් කෙළවරින් පටහට විඳිනු කෙදී, දඹුරු සිට කලපහැර විමෙන් පසු, එනම් බීජ පැළවි දින 70-75 කාලයකින් අමු කරල් ලෙස නෙලා ගත හැකිය. පැයුනු කරල් ලෙස අස්වනු නෙලන්නේ නම්, කොළපු ගොඳින් වියලි අති වීට සහ බීජය සැපු වීට එය එකවර කැඩී යාම සිදුවන අවස්ථාවේදී (දැත් අතරේ ගොඳැලවෙන විට) හෝ බීජවල පහත කෙළවරෙහි කඩ පැහැති ස්ථරයක් පෙන්නන විට අස්වන්න නෙලා ගත යුතුය.

අස්වැන්න

නව වැඩි දියුණු කළ ප්‍රයෝදවලින් මනා පාලන තත්ත්ව යටතේ හෙක්ටයාරයකට කි.ග්‍රෑ. 5000-6000 පමණ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.

පසු අස්වනු කටයුතු

නෙලාගත් වියලි කරල් කොළපු සමඟ දින 2-3 ක් අවිවේ වියලා ගන්න. ඉන්පසු කොළපු ඉවත් කර තවදුරටත් වියලා බීජ වෙන්කර ගන්න. කිසිවිටෙක නෙලාගත් කරල් ගොඩගසා නොතිබිය යුතුය. එය වියලි බීමක හොඳින් ඇසිරිය යුතුය. අස්වනු නෙලූ විගහ තද අවිවේ බීජ වියලීමද නොකල යුතුය.

බීජ නිෂ්පාදනය

විවෘත පරාගනය සහිත ප්‍රයෝදවල බීජ නිෂ්පාදනයේදී වගාව සමාන තිරු (කොටස්) වලට බෙදා එම එක් කොටසක අඩංගු වී ඇති වගාකර ඇති ප්‍රයෝදයට ආවේනික ලක්ෂණ පෙන්නන ගස්වලින් 50% ක් විශේෂයෙන් තෝරාගෙන කරල් නෙලා බීජ සකසා ගන්න.

වැඩි විස්තර සඳහා
 අධ්‍යයන,
 තෙක්වූ තෝරා තේරුම්ගැනීමේ,
 මානවත්වයලීමේ,
 නිවැරදි අයුතු : 035-2249177, 035-2249132

අපි වඩමු - රට නඟමු

දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනය දීර්ඝ ගැන්වීමේ ජාතික මෙහෙයුම් 2007-2010

ලබාගුරුඹ



කෘෂිකම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි.

දේශගුණික අවශ්‍යතා

නොදිග් පැතිරී ගිය වර්ෂාපතනයක් පවතින පහතට විසළී සහ අතරමැදි කලාපවල මහ කන්නයේ මෙම ගෝඨය සාථර්කව වගා කළ හැකිය. අතිරේක ජලසම්පාදන පහසුකම් ඇති නම් යල කන්නයේදී ද මෙම ගෝඨය සාථර්කව වගා කිරීමට පිළිවන. මීට අමතරව තෙත් කලාපයේ නොදිග් ජලවහනයක් පවතින ඉඩම්වල යල කන්නයේදී අමු කටල් නිෂ්පාදනය සඳහා වගා කළ හැකිය.

පස

නොදිග් ජලය බැස යන ගැඹුරු පසක් වගාව සඳහා යෝග්‍යවේ. කාබනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු ඊතු දුඹුරු පස වඩාත් සුදුසුය.

බිම් සැකසීම

කෙ.මී. 15-20 ගැඹුරකට පස පොලිමක් කළයුතු වන අතර, සියුම්ව සකසාගත් සමහරා කරගත් බිමක් බිස සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රභේද	නිර්දේශිත ප්‍රභේද		
	බීජවල	අස්වනු හෙලීමට	සාමාන්‍ය
වන ප්‍රභේද	පැහැය	ගහවන කාලය	අස්වැන්න
		දින	හෝ/වෝ
විවෘත පරාගනය			
නල	තැඹිලි	105-110	4
රැහන්	තැඹිලි	105-110	4
අරුණ	තැඹිලි	90-100	4
මුතු	සුදු	110-115	4
*යම්පත් දෙමුහුම	තැඹිලි	105-110	5-6

*යම්පත් දෙමුහුම : අස්වැන්න වැඩියි.

නියතයට මට්ටන්තු දේ.

බීජ අවශ්‍යතාවය

බිස කි.ග්‍රෑ. 15-20 ක් අතර ප්‍රමාණයක් හෙක්ටයාරයක් වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වේ. අධික ප්‍රෝක්තනයක් සහ දිරියක් සහිත පැළ බෝ ගැනීමට බිස අස්වනු නෙලූ පසු ඉතා ඉක්මනින් සිටුවීම සල යුතුය. දෙමුහුම් බිස නාවිතා කරන්නේ නම් හෙක්ටයාරයකට බිස කි.ගැ. 12ක් පමණ අවශ්‍ය වේ.

සිටුවීමේ කාලය

අහස් දියෙන් වගා කරන විටදී සැප්තැම්බර් මස අග භාගයේදී හෝ ඔක්තෝබර් මස මුල් භාගයේදී හෝ බීජ සිටුවීමට නිර්දේශ කරනු ලැබේ. යල කන්නයේ දී මෙම ගෝඨය වගා කළ යුත්තේ අප්‍රේල් මස මුල් භාගයේදීය. එහෙත් මනා ජල සම්පාදනයක් සහ කෘමි පාලනයක් ලබාදිය හැකි නම් විසළී කලාපයේ අමු කටල් සඳහා හෝ බේබි කෝන් (ළඳරු කටල්) සඳහා නියමිත කාලයකින් තොරව වගා කළ හැකිය.

පරිහරය

හෙක්ටයාරයකට පැල 55,000 ක සංඛ්‍යාවක් පවතින සේ බිස සිටුවන පරිහරය පහත දී ඇති අයුරින් පවත්වා ගන්න.

බඩ ඉරිඟු වගාව යාන්ත්‍රිකරණය කිරීමේදී රෝද දෙකේ ට්‍රැක්ටරයට සම්බන්ධකර රොටරිය සහ බීජ වර්කට මඟින් බිම් සැකසීම සහ බිස සිටුවීම සිදුකරන බැවින් පේලි අතර පරතරය කෙ.මී. 80 පමණ තිබිය යුතුය. එම නිසා පැළ අතර පරතරය කෙ.මී. 20 - 25 පමණ අඩුකල යුතුය. එමඟින් හෙක්ටයාරයකට පැළ ගහණය 55,000 වන ප්‍රශස්ත අගයේ පවත්වා ගත හැක

බීජ සිටුවීමේ පරිහරය	එක ස්ථානයක ඉතිරි කළයුතු පැළ ගහණ
කෙ.මී. 60x30	එකයි
කෙ.මී. 60x60	දෙකයි

නොහොර යෙදීම

අවසාන බිම් සැකසීමත් සමඟ ගෝඨයට අවශ්‍ය පොස්පරස් හා පොරැෂ් සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය හා අවශ්‍ය නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයෙන් 1/3 ක් නොදිග් මිශ්‍රකර බිස සිටුවීමට ප්‍රථම පසට යෙදිය යුතුය. කිසියම් අයුරකින් මෙම පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීමට නොහැකි වුවහොත්, බිස සිටුවා දින 10-14 ක් ඇතුළත සමහර අයුරින් බෙදිය හැකි සේ සිටුවන ලද පේලි අතරින් මූලික පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීමට පියවර ගන්න. ඉතිරි නයිට්‍රජන් පොහොර ප්‍රමාණය සති 4-5 අවස්ථාවල අතල් 4-5 දුරින් පස භූලට යෙදිය යුතුයි.

අහස් දියෙන් වගා කරන විට	ප්‍රමාණය (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)
මූලික පොහොර	
යුරියා	75
කාන්දු සුපර පොස්පේට්	100
මියුරියේට් ඔෆ් පොරැෂ්	50
මතුපිට පොහොර	
යුරියා (සති 4-5 දී)	140

පසෙහි තෙතමනය ප්‍රමාණවත් නොවේ නම් මතුපිට පොහොර යෙදීම ප්‍රමාද කරන්න.

ජල සම්පාදනයෙන් වගා කරන විට	ප්‍රමාණය (කි.ග්‍රෑ/හෙක්)
මූලික පොහොර	
යුරියා	75
කාන්දු සුපර පොස්පේට්	100
මියුරියේට් ඔෆ් පොරැෂ්	50
මතුපිට පොහොර	
යුරියා (සති 4-5 දී)	250

ජල සම්පාදනය

අධික වර්ෂා පවතින විටදී වගාව තුළ රැඳී නොපවතින පරිදී ජලය නොදිග් බැස යාමට සැලැස්විය යුතුය. බීජ සිටුවා දින 85-90 ක් ගතවූ පසු ජල සම්පාදනය නතර කළ හැකිය. මල් පිපෙන අවධියේදී ජල නිත්‍යවශයකට මුහුණපෑම සම්පූර්ණයෙන් වළකාලිය යුතුය.